

# ECTiLAN

SPRAY DO GARDŁA

EKTOINA  
+

NANOKOLOID SREBRA

**ECTILAN** wspomaga leczenie stanów zapalnych gardła wywołanych przez infekcje bakteryjne i wirusowe.

**ECTILAN** zawiera ektoinę [Ectoin®] występującą w przyrodzie naturalną cząsteczkę chroniącą komórki, która wykazuje właściwości łagodzące stan zapalny i stabilizujące błony komórkowe. Obecne w **ECTILANIE** nanokoloidy srebra ograniczają stan zapalny oraz wspomagają odzyskanie przez błonę śluzową pierwotnej funkcji ochronnej.

## Ectoin®+Nano Complex

**ECTILAN** tworzy warstwę ochronną Ectoin®+Nano Complex na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła, która zabezpiecza oraz stabilizuje błony komórkowe, zmniejszając ryzyko wystąpienia infekcji bakteryjnych i wirusowych.

Dodatkowo **ECTILAN** wykazuje właściwości nawilżające względem suchej i podrażnionej śluzówki.

## WSKAZANIA:

- zapalenie migdałków podniebiennych
- zapalenia błony śluzowej gardła
- zapalenia błony śluzowej jamy ustnej
- stan po usunięciu migdałków podniebiennych

**SKŁAD:** Wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej, ektoina [Ectoin®], sorbitol, gliceryna, chlorek sodu, kwas cytrynowy, aromat ananasowy, nanokoloid srebra, woda oczyszczona

**DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE I INTERAKCJE:** Nie stwierdzono


**PRZECIWWSKAZANIA:** Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na srebro metaliczne.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Unikać kontaktu z oczami. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania. Nie należy używać po upływie terminu ważności. Preparat może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

**PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić od światła.




Rys. 1



**SPOSÓB UŻYCIA I DAWKOWANIE: Dorośli i dzieci powyżej 1. roku życia:** U dzieci wyrób powinien być stosowany pod nadzorem osoby dorosłej. Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypchnąć go płynem (Rys.1). Rozpylić w kierunku gardła 1-2 dawki (Rys.2). Stosować dwa razy dziennie lub w zależności od potrzeb. Bezpośrednio po aplikacji nie należy pić ani spożywać posiłków, aby zapewnić pełną skuteczność preparatu.

**POSTAĆ I OPAKOWANIE:** Preparat dostępny jest w postaci sprayu (płyn z dozownikiem) o poj. 20ml

Rys. 2



**WYTWÓRCA:**

**SOLINEA**

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.  
Elizówka 65, Hala I  
21-003 Ciecierzyn, Polska  
stan informacji: 04.2020


**OZNACZENIE SYMBOLI NA OPAKOWANIU:**

CE – znak CE

 - data przydatności

 - numer partii

 - przed użyciem zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania

 - temperatura przechowywania

 - wytwórca