

# ECTiLAN junior

## SPRAY DO GARDŁA Z EKTOINĄ

**ECTILAN junior** wspomaga leczenie stanów zapalnych gardła wywołanych przez infekcje bakteryjne i wirusowe.

**ECTILAN junior** zawiera ektoinę (Ectoin®) występującą w przyrodzie naturalną cząsteczkę chroniącą komórki, która wykazuje właściwości łagodzące stan zapalny i stabilizujące błony komórkowe.

Obecne w **ECTILANIE junior** nanokoloidy srebra ograniczają stan zapalny oraz wspomagają odzyskanie przez błonę śluzową pierwotnej funkcji ochronnej.

### Ectoin®+Nano Complex

**ECTILAN junior** tworzy warstwę ochronną Ectoin®+Nano Complex na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła, która zabezpiecza oraz stabilizuje błony komórkowe, zmniejszając ryzyko wystąpienia infekcji bakteryjnych i wirusowych. Dodatkowo **ECTILAN junior** wykazuje właściwości nawilżające względem suchej i podrażnionej śluzówki.

### WSKAZANIA:

- zapalenia migdałków podniebiennych
- zapalenia błony śluzowej gardła
- zapalenia błony śluzowej jamy ustnej
- stan po usunięciu migdałków podniebiennych

**SKŁAD:** Wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej, ektoina (Ectoin®), sorbitol, gliceryna, chlorek sodu, kwas cytrynowy, aromat ananasowy, nanokoloid srebra, woda oczyszczona


**DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE I INTERAKCJE:** Nie stwierdzono

**PRZECIWWSKAZANIA:** Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na srebro metaliczne.


**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Unikać kontaktu z oczami. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania. Nie należy używać po upływie terminu ważności. Preparat może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

**PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić od światła.

Rys. 1



Rys. 2



**SPOSÓB UŻYCIA I DAWKOWANIE:** **dzieci powyżej 1. roku życia:** Wyrób powinien być stosowany pod nadzorem osoby dorosłej. Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem (Rys.1). Rozpylić w kierunku gardła 1-2 dawki (Rys.2). Stosować dwa razy dziennie lub w zależności od potrzeb. Bezpośrednio po aplikacji nie należy pić ani spożywać posiłków, aby zapewnić pełną skuteczność preparatu.

**POSTAĆ I OPAKOWANIE:** Preparat dostępny jest w postaci sprayu (płyn z dozownikiem) o poj. 20ml

**WYTWÓRCA:**

**SOLINEA**

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.  
Elizówka 65, Hala I  
21-003 Ciecierzyn, Polska  
stan informacji: 09.2018

**OZNACZENIE SYMBOLI NA OPAKOWANIU:**



- znak CE



- data przydatności



- numer partii



- przed użyciem, zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania



- temperatura przechowywania