

ALECTOIN



Instrukcja użytkowania

Przed zastosowaniem kropli ALECTOIN prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Należy zachować niżejszą ulotkę, gdyż zawiera ona ważne informacje. W razie wątpliwości dotyczących używania preparatu należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub dystrybutorem.

1. Co to jest ALECTOIN i jakie ma zastosowanie

Krople do oczu ALECTOIN są wyrobem medycznym zawierającym ektoinę (Ectoin®), naturalną cząsteczkę chroniącą komórki przed oddziaływaniem szkodliwych czynników, łagodzącą stany zapalne i stabilizującą błony komórkowe. Krople do oczu ALECTOIN to izotoniczny roztwór przeznaczony do stosowania w profilaktyce i wspomaganiu leczenia objawów alergicznego zapalenia spojówek.

Krople skutecznie łagodzą zaczerwienienie, swędzenie i łzawienie oczu. W ciągu 30 sekund następuje szybka redukcja objawów takich jak swędzenie, łzawienie i podrażnienie oczu. Chronią oczy przed szkodliwym wpływem alergenów, przyspieszając proces regeneracji podrażnionej i nadwrażliwej spojówki. Krople mogą być stosowane przez osoby noszące soczewki kontaktowe oraz osoby z nadwrażliwością oczu. Krople do oczu ALECTOIN nie zawierają środków konserwujących.

2. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kropli do oczu ALECTOIN nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ektoinę lub na inne składniki kropli do oczu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej po zastosowaniu produktu należy niezwłocznie przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem. Ze względów higienicznych zaleca się, aby produkt stosowany był tylko przez jednego użytkownika. Produkt należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia. Nie używać produktu zniszczonego lub uszkodzonego. Krople do oczu Alectoin należy przechowywać w miejscu nieodstępnym dla dzieci.

3. 0 czym trzeba wiedzieć przed użyciem kropli ALECTOIN

Brak jest dostępnych danych dotyczących interakcji między kroplami do oczu ALECTOIN a innymi kroplami lub stosowanymi miejscowo maściami do oczu, stąd nie zaleca się stosowania z innymi preparatami do miejscowego leczenia okulistycznego.

4. Sposób użycia

ALECTOIN należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją użytkowania. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. O ile lekarz nie zaleci inaczej, zakraplać 1-2 krople do każdego oka kilka razy dziennie. W razie potrzeby, krople do oczu ALECTOIN mogą być używane kilka razy w ciągu godziny.

1. Zdjąć osłonkę zabezpieczającą końcówkę zakraplacza, uważając aby nie dotknąć końcówki zakraplacza.
2. Palec wskazujący i środkowy położyć na okrągłej płytce na czubku buteleczki, kciuk przykładając do jej spodu.
3. Przed pierwszym użyciem należy odwrócić butelkę zakraplaczem w dół i nacisnąć kciukiem na spód butelki (ok. 2-3 razy) do momentu spłynięcia pierwszych kropli. Nie odcinać końcówki zakraplacza.
4. Odchylić głowę, palcem wskazującym odciągnąć dolną powiekę w dół i patrząc w górę zakroplicz preparat do oka trzymając butelkę zakraplaczem w dół i naciskając okrągłą płytkę na butelce. Unikać bezpośredniego kontaktu końcówki zakraplacza z palcami, oczami lub soczewkami kontaktowymi. Dzięki opatentowanemu mechanizmowi z pompką, z buteleczki wypłynie tylko jedna kropla.
5. Zamknąć powoli oko tak, aby preparat równomiernie rozprowadził się na soczewce oka.
6. W ten sam sposób zakroplicz preparat do drugiego oka.
7. Po każdym zastosowaniu należy osuszyć końcówkę zakraplacza i zamknąć ją osłonką zabezpieczającą.

5. Możliwe skutki uboczne

ALECTOIN jest dobrze tolerowanym preparatem – nie są znane występujące regularnie lub utrzymujące się działania niepożądane. W pojedynczych przypadkach krople mogą powodować krótkotrwałe podrażnienie oka, przekrwienie gałki ocznej albo zapalenie spojówki. W razie zaobserwowania wystąpienia skutków ubocznych podczas stosowania kropli ALECTOIN należy zgłosić je lekarzowi, farmaceucie albo dystrybutorowi preparatu. W przypadku utrzymywania się działań niepożądanych produktu należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

6. Przechowywanie

Termin ważności umieszczony jest na pudełku oraz buteleczce z kroplami.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Należy przechowywać w temperaturze 2-25°C.

7. Informacje dodatkowe

Krople do oczu ALECTOIN mogą być stosowane po zabiegach i urazach w obrębie oczu, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Brak jest danych dotyczących stosowania kropli ALECTOIN w trakcie ciąży i w okresie karmienia piersią. W przypadku:

- ciąży lub karmienia piersią

- podejrzenia ciąży

przed zastosowaniem kropli do oczu ALECTOIN należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci w wieku 10 lat i młodsze, a także osoby niemogące samodzielnie zastosować preparatu powinny skorzystać z pomocy osób trzecich.

8. Postać preparatu

Preparat dostępny jest w postaci kropli o pojemności 10 ml

Skład:

Ectoin®, hydroksyetyloceluloza, chlorek sodu, woda, bufor cytrynianowy

Wytwórca:
 bitop AG  0197
Stockumer Str. 28
58453 Witten, Niemcy

Dystrybutor:



Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn, Polska

Stan informacji: 03.2021

Objaśnienie symboli:



Wyrób medyczny z numerem jednostki notyfikowanej



Wytwórca



Należy postępować zgodnie z instrukcją



Temperatura przechowywania



Termin ważności



Wyrób sterylny,
przetwarzany aseptycznie



Numer partii



Nie używać zniszczonych
lub uszkodzonych wyrobów