

# ECTILAN

## SPRAY DO GARDŁA

**EKTOINA  
+  
NANOKOLOID SREBRA**

**ECTILAN** wspomaga leczenie stanów zapalnych gardła wywołanych przez infekcje bakteryjne i wirusowe.

**ECTILAN** zawiera ektoinę [Ectoin®] występującą w przyrodzie naturalną cząsteczkę chroniącą komórki, która wykazuje właściwości łagodzące stan zapalny i stabilizujące błony komórkowe. Obecne w **ECTILANIE** nanokolojdy srebra ograniczają stan zapalny oraz wspomagają odzyskanie przez błonę śluzową pierwotnej funkcji ochronnej.

### Ectoin®+Nano Complex

**ECTILAN** tworzy warstwę ochronną Ectoin®+Nano Complex na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła, która zabezpiecza oraz stabilizuje błony komórkowe, zmniejszając ryzyko wystąpienia infekcji bakteryjnych i wirusowych.

Dodatkowo **ECTILAN** wykazuje właściwości nawilżające względem suchej i podrażnionej śluzówki.

### WSKAZANIA:

- zapalenie migdałków podniebiennych
- zapalenia błony śluzowej gardła
- zapalenia błony śluzowej jamy ustnej
- stan po usunięciu migdałków podniebiennych

**SKŁAD:** Wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej, ektoina [Ectoin®], sorbitol, gliceryna, chlorek sodu, kwas cytrynowy, aromat ananasowy, nanokolojdy srebra, woda oczyszczona


**DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE I INTERAKCJE:** Nie stwierdzono

**PRZECIWWSKAZANIA:** Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na srebro metaliczne.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Unikać kontaktu z oczami. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania. Nie należy używać po upływie terminu ważności. Preparat może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.


**PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić od światła.

Rys. 1



**SPOSÓB UŻYCIA I DAWKOWANIE:** Dorosli i dzieci powyżej 1. roku życia: U dzieci wyrób powinien być stosowany pod nadzorem osoby dorosłej. Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem [Rys.1]. Rozpylić w kierunku gardła 1-2 dawki [Rys.2]. Stosować dwa razy dziennie lub w zależności od potrzeb. Bezpośrednio po aplikacji nie należy pić ani spożywać posiłków, aby zapewnić pełną skuteczność preparatu.

Rys. 2




**POSTAĆ I OPAKOWANIE:** Preparat dostępny jest w postaci sprayu (płyn z dozownikiem) o poj. 20ml

 **WYTWÓRCA:**

**SOLINEA**

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.  
Elizówka 65  
21-003 Ciecierzyn, Polska  
stan informacji: 05.2021


**OZNACZENIE SYMBOLI NA OPAKOWANIU:**

 - znak CE

 - data przydatności

 - numer partii

 - przed użyciem zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania

 - temperatura przechowywania

 - wytwórca