

ectossin

Instrukcja użytkowania

Przed zastosowaniem preparatu ECTOSSIN prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Należy zachować niniejszą ulotkę gdyż zawiera ona ważne informacje. W razie wątpliwości dotyczących sposobu użytkowania preparatu ECTOSSIN należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub dystrybutorem.

1. Co to jest ECTOSSIN i jakie ma zastosowanie.

ECTOSSIN jest wyrobem medycznym zawierającym ektoinę (Ectoin®), występującą w przyrodzie, naturalną cząsteczkę chroniącą komórki, która wykazuje właściwości łagodzące stany zapalne i stabilizujące błony komórkowe.

ECTOSSIN to pastylki na gardło z ektoiną przeznaczone do stosowania w profilaktyce i wspomaganiu leczenia objawów przeziębienia, suchości w jamie ustnej i gardle oraz chrypki wynikającej z przeciążenia strun głosowych.

Preparat tworzy warstwę ochronną tzw. „Ectoin® Hydro Complex” na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła, nie powodując uczucia lepkości. Pastylki stabilizują błony komórkowe, zmniejszając ryzyko wystąpienia infekcji bakteryjnych i wirusowych jamy ustnej i gardła.

Preparat zwiększa produkcję śluzu i łagodzi stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Pastylki ECTOSSIN łagodzą ból gardła, ból przy przełykaniu i chrypkę. Ponadto preparat ECTOSSIN nawilża suchą i podrażnioną błonę śluzową oraz wspomaga jej regenerację. Preparat zmniejsza podrażnienie i suchość gardła spowodowane nadmiernym przeciążeniem głosu, alergenami, suchym powietrzem np. w ogrzewanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach, zanieczyszczonym powietrzem lub dymem.

Pastylki ECTOSSIN mają orzeźwiający smak przez co wspomagają swobodne oddychanie.

Pastylki ECTOSSIN są w pełni stworzone z naturalnych składników oraz nie zawierają konserwantów.

2. Ostrzeżenia i środki ostrożności.

- W trakcie przewlekłych urazów, po operacji lub uszkodzeniu jamy ustnej, przed użyciem preparatu ECTOSSIN należy skonsultować się z lekarzem.
- Preparatu ECTOSSIN nie należy stosować u dzieci poniżej 6. roku życia ze względu na ryzyko zadławienia.
- Nie należy stosować pastylek w pozycji leżącej ze względu na ryzyko zadławienia.
- Nie używać pastylek pochodzących z uszkodzonego blistra.
- Preparatu ECTOSSIN nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ektoinę lub którykolwiek ze składników preparatu.
- W przypadku reakcji alergicznej należy natychmiast zaprzestać stosowania preparatu ECTOSSIN.
- Preparat ECTOSSIN należy przechowywać w miejscu nieodstępnym dla dzieci.

3. O czym należy wiedzieć przed zastosowaniem preparatu ECTOSSIN.

Nie ma danych na temat interakcji między preparatem ECTOSSIN a innymi pastylkami, podawanymi doustnie wyrobami medycznymi lub lekami. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem innych preparatów na gardło w trakcie stosowania pastylek ECTOSSIN.

4. Informacje dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Obecnie nie ma żadnych danych dotyczących stosowania preparatu ECTOSSIN w czasie ciąży i karmienia piersią. W przypadku ciąży, karmienia piersią lub podejrzenia ciąży przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

5. Sposób użycia preparatu ECTOSSIN.

1 pastylka do ssania co 3 godziny lub w zależności od potrzeb. Nie przyjmować powyżej 10 pastylek dziennie.

6. Możliwe działania niepożądane.

Preparat ECTOSSIN jest dobrze tolerowany. Dotychczas nie stwierdzono żadnych regularnie

występujących ani utrzymujących się działań niepożądanych. W przypadku stosowania w nadmiernych ilościach, bardzo rzadko może dojść do wystąpienia efektu przeczyszczającego w związku z zawartością izomaltu.

Należy poinformować lekarza, farmaceutę lub dystrybutora o wszelkich działaniach niepożądanych zaobserwowanych w związku ze stosowaniem preparatu ECTOSSIN.

W przypadku utrzymywania się lub zaostrzenia objawów niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

7. Jak przechowywać preparat ECTOSSIN.

Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 2-25°C.

Data ważności preparatu ECTOSSIN znajduje się na pudetku i blistrach. Nie należy stosować preparatu ECTOSSIN po upływie daty ważności.

8. Zawartość preparatu ECTOSSIN i inne informacje.

Opakowanie zawiera 24 pastylki.

Skład: ectoina (Ectoin®), izomalt, sukraloza, mentol, kwas cytrynowy, aromat cytrynowo-miętowy (zawiera tokoferol), aromat miodowy (zawiera glikol polietylenowy), koncentrat z krokosza barwierskiego, syrop glukozowy, woda.

Wytwórca:  
bitop AG
Stockumer Str. 28,
58453 Witten, Niemcy









Dystrybutor:



Solinea Sp. z o.o. Sp.K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn, Polska
Infolinia: 0801703312

Stan informacji: 05.2021

Oznaczenie symboli na opakowaniu:

	- znak CE
	- numer partii
	- Wytwórca
	- zapoznać się z instrukcją użytkowania
	- termin ważności
	- temperatura przechowywania
	- nie używać pastylek pochodzących ze zniszczonego lub przebitego blistra
	- przechowywać w suchym miejscu