

KOLZYM

Suplement diety



Enzym laktaza w kroplach

Przed zastosowaniem preparatu Kolzym prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Należy zachować niniejszą ulotkę, gdyż zawiera ona ważne informacje.

1. Czym jest Kolzym i jakie ma zastosowanie?

Kolzym to suplement diety zawierający enzym laktazę.

Laktaza odpowiada za hydrolizę cukru mlecznego – laktozy do monocukrów: glukozy i galaktozy, które są łatwiej wchłaniane przez organizm. Obecność dwóch rodzajów laktazy – kwaśnej i neutralnej w preparacie Kolzym, zapewnia wysoką aktywność obu enzymów w szerokim zakresie pH (pH żołądka i mleka).

2. Sposób użycia:

O ile lekarz nie zaleci inaczej, podawać do każdego posiłku w następujący sposób:

Wiek dziecka	Ilość kropli przypadająca na jeden posiłek
Od 0 do 2 tygodni	5
Od 3 do 4 tygodni	6
Od 1 do 2 miesięcy	8
Od 3 do 4 miesięcy	9
Powyżej 4 miesiąca	12

Wstrząsnąć przed użyciem.

Karmienie piersią:

Po odmierzeniu na łyżeczkę odpowiedniej ilości kropli (zgodnie z tabelą), podać dziecku do spożycia bezpośrednio przed rozpoczęciem karmienia piersią.

Mleko modyfikowane:

Przygotować mleko zgodnie z zaleceniami producenta. Krople dodać zgodnie z tabelą do mleka o temperaturze właściwej do podania, wstrząsnąć i podać dziecku. Nie należy przechowywać niespożytego mleka.

Mleko do późniejszego wykorzystania (pokarm naturalny):

Do odciągniętego mleka dodać 4 krople Kolzymu i wstawić do lodówki na minimum 4 godziny. Przed użyciem podgrzać mleko do temperatury właściwej do podania. Nie należy przechowywać niespożytego mleka.

Enzym laktaza ulega niszczeniu pod wpływem wysokiej temperatury, stąd preparatu nie należy dodawać do bardzo gorącego mleka.

3. Ostrzeżenia:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zróżnicowany sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia produktu, należy unikać kontaktu końcówek zakraplacza z pożywieniem, skórą i przedmiotami codziennego użytku.

4. Przeciwwskazania:

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. W przypadku zaobserwowania wystąpienia niepokojących objawów u dziecka w trakcie stosowania preparatu Kolzým należy skontaktować się z lekarzem. Nie stosować po upływie daty minimalnej trwałości.

5. Składniki:

Syrop glukozowy, laktaza neutralna, sacharoza, woda, laktaza kwaśna.

Enzymy pochodzenia naturalnego: laktaza kwaśna z wyciągu grzyba *Aspergillus oryzae* i laktaza neutralna z wyciągu drożdży *Kluyveromyces lactis*.

Składniki w porcji preparatu	5 kropli	6 kropli	8 kropli	9 kropli	12 kropli
Laktaza kwaśna	1,4 mg	1,8 mg	2,3 mg	2,6 mg	3,4 mg
Laktaza neutralna	25,3 mg	30,4 mg	40,5 mg	45,5 mg	60,7 mg

6. Przechowywanie:

Data minimalnej trwałości umieszczona na opakowaniu i etykiecie. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie zamrażać. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Zużyć w ciągu 3 tygodni od otwarcia opakowania. Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Objętość netto: 15 ml

KOLZÝM



Suplement diety

Producent:

SOLINEA

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn, Polska

Wyprodukowano w UE