

suplement diety

SOLAQ

SOLINEA

Opis:

Głównym składnikiem preparatu jest laktuloza, dwucukier składający się z galaktozy połączonej z fruktozą. Laktuloza przyspiesza pasaż jelitowy. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania jednorazowo 10 g laktulozy dziennie.

Składniki:

Laktuloza (**lakttoza**), woda oczyszczona, aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

Skład zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia	15 ml
Laktuloza	10 g

Sposób użycia:

1 raz dziennie 15 ml syropu.

Syrop można przyjmować rozcieńczając go w wodzie lub innych płynach. Działanie laktulozy rozpoczyna się po 2-10 godzinach od podania. Korzystne działanie występuje w przypadku spożycia jednorazowo 15 ml syropu (10 g laktulozy) dziennie.

Ostrzeżenia:

Produkt przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Preparat nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Preparat nie może być stosowany w przypadku alergii lub nietolerancji laktozy lub galaktozy, podwyższonego stężenia galaktozy we krwi oraz niedrożności jelit. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do odwodnienia organizmu i zaburzeń gospodarki elektrolitowej.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i bezpośredniego działania słońca. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki.

Objętość netto:

Preparat dostępny jest w objętościach: 200 ml, 500 ml.

Producent:



Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65, Hala I
21-003 Ciecierzyn, Polska
Wyprodukowano w UE

