

nebu-dose

isotonic

Nebu dose isotonic to 0,9% roztwór soli, dostępny w postaci jednorazowych ampułek, nie zawierający konserwantów.

Preparat przeznaczony jest do nebulizacji. Działanie preparatu polega na wykorzystaniu różnych mechanizmów ułatwiających usunięcie wydzieliny z dróg oddechowych, poprawiając w ten sposób komfort oddychania poprzez:

- rozbijanie wiązań jonowych w żelu śluzowym, zmniejszając w ten sposób poziom lepkości i elastyczności wydzieliny
- absorpcję wody z błony śluzowej oraz podśluzowej, tym samym zmniejszając obrzęk ścian dróg oddechowych
- wywołanie odruchu kaszlu i wykrztuszanie wydzieliny, co może pomóc usunąć śluz z oskrzeli, prowadząc do udrożnienia dróg oddechowych

Preparat przeznaczony jest również do codziennego stosowania w celu higieny oczu i nosa.

WSKAZANIA

Głównymi wskazaniami do stosowania **Nebu dose isotonic** są:

- **Terapia inhalacyjna:** jest wskazany dla pacjentów w każdym wieku, w szczególności cierpiących na zapalenie oskrzelików, ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydozę oraz

przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP). Preparat może być również stosowany jako rozpuszczalnik dla produktów leczniczych przeznaczonych do inhalacji.

- **Płukanie i przemywanie oczu:** zmniejsza dyskomfort wywołany przez niekorzystne warunki środowiska zewnętrznego, takie jak klimatyzacja, ogrzewanie oraz suche, zanieczyszczone i zadymione powietrze.
- **Płukanie i oczyszczanie nosa:** przynosi ulgę w przypadku suchości lub niezytu nosa.

SPOSÓB UŻYCIA

Terapia inhalacyjna. Może być stosowany z dowolnym rodzajem nebulizatora. Roztwór należy stosować zgodnie z instrukcją użytkownika dołączoną do produktu do inhalacji.

Używać 4 ml lub 5 ml roztworu w terapii wziewnej zgodnie z zaleceniem lekarza.

Higiena oczu: do zakraplania, przemywania lub płukania. Roztwór może być stosowany na powierzchnię oka po nałożeniu soczewek kontaktowych. Delikatnie nacisnąć ampułkę, aby zakropić kilka kropli roztworu na powierzchnię oka. Powtarzać tyle razy, ile potrzeba. Należy odczekać 15 minut przed zastosowaniem jakiegokolwiek innego preparatu do oczu.

Higiena nosa: do płukania i oczyszczania suchego lub zatkanego nosa.

Odchylić głowę do tyłu. Wprowadzić ostrożnie końcówkę ampułki do otworu nosowego i delikatnie nacisnąć, zakraplając kilka kropli. Powtórzyć ten sam proces w drugim otworze nosowym. Wyprostować głowę w celu umożliwienia odpływu śluzu i wytrzeć nadmiar płynu. Używać tyle razy, ile potrzeba. Nie wydmuchiwać nosa przez 10 minut po zastosowaniu preparatu.

W przypadku niemowląt aplikować preparat przy użyciu jak najmniejszej siły celem uniknięcia jakichkolwiek powikłań w uchu środkowym.

PRZECHOWYWANIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temp. poniżej 25°C.
- Ten produkt nie zawiera konserwantów. Ze względu na ryzyko szybkiego rozwoju skażenia bakteryjnego, nie należy używać ampułki, która jest otworzona lub uszkodzona.
- Nie stosować razem z innymi lekami, chyba, że po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
- U bardzo wrażliwych pacjentów podawanie preparatu powinno odbywać się zgodnie ze wskazaniami lekarza, ponieważ może być konieczne wcześniejsze podanie leku rozszerzającego oskrzela.
- W przypadku skurczów oskrzelików lub uporczywego kaszlu należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.
- Nie używać produktu po upływie terminu ważności.
- Nie używać, jeśli ampułka jest uszkodzona.
- Do bezpośredniego użycia. Jedna ampułka może być używana tylko przez jedną osobę.
- Tej samej ampułki nie należy używać jednocześnie do oczu i nozdrzy.
- Nie stosować do iniekcji.

SKŁAD

Sterylny roztwór chlorku sodu 0,9%.

OPAKOWANIE

Opakowanie zawiera 100 ampułek po 5ml.

WYTWÓRCA



UNOLAB MANUFACTURING, S.L.
Av/De las flores 6, 28970
Humanes de Madrid (Madryt), Hiszpania

DYSTRYBUTOR



SOLINEA
Elizówka 65, HALA I,
21-003 Ciecierzyn, Polska

Stan informacji: 05.2017

Rev.2017/MAR/13



wytwórca



wyrób sterylny,
przetwarzany aseptycznie



wyrób medyczny z numerem
jednostki notyfikowanej



do jednorazowego użycia



należy postępować zgodnie
z instrukcją



nie stosować do iniekcji



numer partii



termin ważności